

## Algoritmus č. 1: pacient se dostaví do zdravotnického zařízení

### Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření a předávání informací u pacientů s možnou infekcí COVID-19

#### Kritéria hodnocení onemocnění COVID-19:

- **Klinická:** akutní respirační infekce (náhle vzniklý alespoň jeden z příznaků-horečka, kašel, dušnost) nebo akutní respirační selhání (SARI), bez plného objasnění příčiny
  - **Epidemiologická:** pozitivní epidemiologická anamnéza = **pobyt v zemi s lokálním přenosem COVID-19 \* ≤ 14 dní** před objevením prvních příznaků, nebo úzký kontakt s osobou splňující výše uvedená klinická kritéria.
- WHO definice případů jsou uvedeny v příloze k tomuto algoritmu.

klinická **ANO**  
epidemiologická **NE**

**A**

klinická **NE**  
epidemiologická **ANO**

**B**

klinická **ANO**  
epidemiologická **ANO**

**C**

- hospitalizace nebo domácí léčba podle závažnosti stavu
- vyšetření jako u komunitních respiračních infekcí
- laboratorní vyšetření na průkaz **SARS-CoV-2** se standardně neprovádí
- v případě hospitalizovaného pacienta s klinickým obrazem SARI (těžké respirační selhání), u kterého není jiné vysvětlení jeho klinického stavu, provést laboratorní vyšetření na průkaz **SARS-CoV-2**

- informovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede vyhodnocení rizika postupem podle „E“ algoritmu č. 2
- doporučit dotčené osobě v maximální možné míře omezit kontakt s veřejností a dále doporučit sebezpozorování zaměřené na příznaky nemoci a měření tělesné teploty 2krát denně během inkubační doby
- po dodatečném naplnění klinických kritérií v inkubační době se postupuje podle „C“.

- kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, dle jeho rozhodnutí zajistit izolaci a vyšetření pacienta na koronavirus SARS-CoV-2
- personál ošetřující pacienta vždy vybavit OOPP (filtrační maska FFP3/FFP2, plášť, rukavice, brýle, čepice)
- pacient se suspektní nákazou SARS-CoV-2 je hospitalizován na regionálním infekčním oddělení v izolačním režimu pro vzduchem přenášené infekce
- vzorek k vyšetření je odeslán do příslušné laboratoře po předchozím telefonickém dohovoru
- epidemiolog KHS informuje MZ-sekci HH

**C**

**Nazofaryngeální výtěr (odeslat vždy první odebraný vzorek)**, ev. tracheální aspirát nebo tracheální stěr u intubovaného pacienta.  
Odebraný materiál odeslat **do NRL pro chřipku**, SZÚ v trojbalu UN 3373, žádanku neumísťovat do plastové nádoby trojbalu!

**Požadovat vyšetření na průkaz SARS-CoV-2**  
Případný požadavek na další původce respiračních onemocnění musí být uveden na žádance

**K dezinfekci je nezbytné používat prostředek s plně virucidními účinky**

O výsledcích indikovaných virologických vyšetření k detekci **SARS-CoV-2** je informován:

- poskytovatel zdravotních služeb zadávající vyšetření
- indikující epidemiolog místně příslušné KHS, který informuje MZ-sekci hlavní hygieničky (HH) ČR

V případě potvrzení onemocnění **COVID-19** Nemocnice Na Bulovce převezme péči o pacienta dle svých kapacitních možností po předchozí telefonické domluvě.

\* Země s lokálním přenosem COVID-19:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Tento algoritmus byl vypracován dne 28. 1. 2020, aktualizován dne 5. 3. 2020 a bude dále upravován v závislosti na změnách epidemiologické situace a souvisejících nových poznatcích.